


**ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ**  
**ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ**



**ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΣ**  
**ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΚΟΚΚΙΚΗΣ**  
**ΝΟΣΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ**

**ΕΤΟΣ 2017**

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ**

---

Στην παρούσα έκθεση παρουσιάζονται συνοπτικά τα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα μηνιγγιδοκοκκικής νόσου για το έτος 2017 σύμφωνα με τις δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν στο Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Μηνιγγίτιδας. Οι δοκιμές ταυτοποίησης του βακτηρίου *Neisseria meningitidis* σε κλινικά δείγματα έγιναν σύμφωνα με διαπιστευμένες μεθόδους κατά ISO 15189:2012.

Κατά το έτος 2017 δηλώθηκαν **42** κρούσματα μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου εκ των οποίων **32** επιβεβαιώθηκαν εργαστηριακά, αριθμός μειωμένος συγκριτικά με το προηγούμενο έτος ( 2016: 53 δηλωθέντα κρούσματα , 46 επιβεβαιωμένα).

Η ηλικιακή κατανομή των κρουσμάτων και η επίπτωση της νόσου ανά 100.000 κατοίκους παρουσιάζεται στον πίνακα 1, ενώ ο πίνακας 2 παρουσιάζει την κατανομή των κρουσμάτων ανά ηλικιακή ομάδα και οροομάδα. Όπως φαίνεται στον πίνακα 2, η πλειονότητα των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων ανήκε στην οροομάδα B (MenB) (26/32, 81,3%) με επόμενες σε συχνότητα οροομάδες Y (2/32, 6,3%) και W (2/32, 6,3%) και C (1/32, 3,1%) ενώ 1 θετικό δείγμα (1/32, 3,1%) δεν τυποποιήθηκε (Non Groupable-NG) ως προς τις οροομάδες A, B, C, W και Y.

Συνολικά καταγράφηκαν **3 θανατηφόρα κρούσματα** επί του συνόλου των 32 επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, η θνητότητα ανήλθε σε 9,4 % ενώ η θνησιμότητα ανήλθε στους 0.03 θανάτους /100.00 κατ ταυτόσημη με αυτήν του έτους 2016. Ένα θανατηφόρο κρούσμα ανήκε στην ηλικιακή ομάδα 1-4 ετών (οροομάδα B), 1 θανατηφόρο κρούσμα ανήκε στην ηλικιακή ομάδα 15-19 (οροομάδα W) και τέλος, 1 θανατηφόρο κρούσμα ανήκε στην ηλικιακή ομάδα 25-29 (οροομάδα Y).

## ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ

**Πίνακας 1:** Ηλικιακή κατανομή εργαστηριακώς επιβεβαιωμένων κρουσμάτων μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου και επίπτωση ανά 100.000 κατοίκους για το έτος 2017

Ηλικιακή Ομάδα	Αρ.Κρουσμάτων	Ποσοστό επί του συνόλου (%)	Επίπτωση/100.000*
<1	7	21,9%	7,45
1-4	5	15,6%	1,31
5-9	3	9,4%	0,55
10-14	0	0,0%	0,00
15-19	1	3,1%	0,19
20-24	4	12,5%	0,73
25-29	4	12,5%	0,68
30-34	0	0,0%	0,00
35-39	0	0,0%	0,00
40-44	1	3,1%	0,12
45-49	2	6,3%	0,24
50-54	1	3,1%	0,13
55-59	1	3,1%	0,14
60-64	2	6,3%	0,31
>65	1	3,1%	0,04
<b>Σύνολο</b>	<b>32</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,30</b>

\* Ο πληθυσμός για τον υπολογισμό της επίπτωσης της νόσου έγινε σύμφωνα με την εκτίμηση της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας για το έτος 2017 .

## ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ

Πίνακας 2: Κατανομή των κρουσμάτων ανά ηλικιακή ομάδα και ορομάδα

Ηλικιακή Ομάδα	Ορομάδες					Σύνολο	Ποσοστό επι του συνόλου (%)
	B	C	W	Y	NG*		
<1	6		1			7	21,9%
1-4	4				1	5	15,6%
5-9	3					3	9,4%
10-14			1			1	3,1%
15-19						0	0
20-24	3			1		4	12,5%
25-29	3			1		4	12,5%
30-34						0	0
35-39						0	0
40-44		1				1	3,1%
45-49	2					2	6,3%
50-54	1					1	3,1%
55-59	1					1	3,1%
60-64	2					2	6,3%
>65	1					1	3,1%
<b>Σύνολο</b>	<b>26</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>32</b>	<b>100,0%</b>
<b>Ποσοστό επι του συνόλου (%)</b>	<b>81,3%</b>	<b>3,1%</b>	<b>6,3%</b>	<b>6,3%</b>	<b>3,1%</b>		

\* Ως Non Groupable (NG) χαρακτηρίζονται τα κλινικά δείγματα με αρνητική καλλιέργεια τα οποία δεν ανήκουν σε καμία από της ορομάδες A, B, C, W και Y για τις οποίες γίνεται τυποποίηση με την μέθοδο της multiplex PCR.